

et de ceux qui dessinent les stries des élytres se dressent des poils noirs qui donnent à tout l'insecte un aspect vilain. Pointe sternale nettement accusée; face ventrale d'un vert olive; les pattes ont leurs cuisses vert olive foncé passant au brun et les jambes ainsi que les tarses bruns. Longueur, 1/4 millim.

*Coptomia Oliveri*, n. sp.

Mâle et femelle. Oblongo-ovalaire; entièrement brun olivâtre très brillant, glabre en dessus. Tête assez finement et peu régulièrement ponctuée; clypéus profondément échancré en avant, à sillons latéraux bien marqués; corselet très faiblement sinué au bord postérieur, à ponctuation extrêmement fine, surtout sur le disque; écusson pentagonal absolument lisse; élytres non striées à ponctuation à peine visible, absolument glabre, à l'exception de l'extrémité déclive des élytres qui porte quelques poils dressés; cette partie déclive est finement vermiculée et surmontée d'une dent courte mais aiguë; pygidium densément vermiculé. Saillie mésosternale plus longue que large. Face inférieure de la tête et des cuisses des deux premières paires de pattes et face antérieure des hanches de la première paire de pattes et de la saillie mésosternale hérissées de longs crins noirs. Longueur, 20 à 21 millimètres.

Mâle. Abdomen très légèrement déprimé longitudinalement en dessous; pattes moins robustes.

---

NOUVELLES ESPÈCES DE PHALÉNIDÆ RECUEILLIES À MOUPIN

PAR L'ABBÉ A. DAVID,

PAR M. G.-A. POUJADE, PRÉPARATEUR D'ENTOMOLOGIE.

1° *Hyposidra Davidaria* : Envergure, 57 millimètres.

Ailes très oblongues, les supérieures fortement falquées à l'apex, d'un brun chocolat clair en dessus et en dessous, traversées par trois lignes diagonales nuageuses à peine distinctes; quelques mouchetures blanchâtres à leur base.

Une femelle.

2° *Drepanodes subferrugineata* : Ailes oblongues d'un rose saumoné en dessus et orangées en dessous avec atomes gris; supérieures légèrement falquées à l'apex avec une diagonale couleur de rouille et un point cellulaire gris; cette ligne se continue sur les ailes inférieures parallèlement à une autre située presque au milieu.

Une femelle.

3° *Heterolocha mediolimbata* : Envergure, 36 millimètres.

Couleur générale olivâtre clair aspergée de fines lignes d'une couleur

violacée qui est plus étendue vers la base et aux bords externes des ailes. Les supérieures tridentées, traversées obliquement par une bande d'un ton olivâtre, chaud et brillant, lisérée extérieurement d'une ligne fine, nette et denticulée de couleur gris-perle. Cette bande se continue aux ailes inférieures, lesquelles sont anguleuses et denticulées aux nervures. A l'extrémité de la cellule des supérieures la teinte violette laisse un espace arrondi de la couleur du fond.

Un mâle.

4° *Ellopia pseudomacariata* : Ailes ayant une forte dent médiane, les supérieures falquées à l'apex; d'un jaune d'ocre clair piqueté de grisâtre. Ligne coudée, noirâtre, large à la côte, dentée extérieurement et se continuant en grisâtre sur l'aile inférieure; une tache costale, un trait apical et une partie des franges également de couleur noirâtre.

Une femelle.

5° *Hypochroma sinapiaria* : Envergure, 60 millimètres.

D'un vert de moutarde clair finement moucheté de brunâtre. Ailes à denticulations marquées entre les nervures par des lunules brunes. Coudée denticulée aux nervures, sinuée et suivie d'une ombre d'un noir léger; des taches d'un brun verdâtre représentent la subterminale; extra-basilaire fortement denticulée; abdomen à double rangée de touffes verdâtres.

Une femelle.

6° *Xandroma xanthomelanaria* : Envergure, 90 millimètres.

Couleur générale brune vergetée perpendiculairement aux ailes supérieures de linéoles olivâtres, ces ailes sont partagées par un large espace d'ocre jaune clair, nuancé de brun olivâtre vers l'angle interne; ailes inférieures bordées d'ocre jaune vif.

Un mâle.

7° *Gnophos lilliputata* : Envergure, 16 millimètres.

Ailes supérieures non dentées, inférieures à denticulations arrondies; fond d'un blanc terne vergeté perpendiculairement de cendré ombrant, la base et les espaces compris entre l'extra-basilaire et la coudée; ces dernières, teintées d'olivâtre de même que le point cellulaire en forme d'anneau et les taches garnissant les denticulations de la subterminale; franges blanches précédées de points internervuraux noirâtres. Antennes simples, plus fortes chez le mâle, tibias postérieurs élargis et renflés munis de quatre éperons. C'est la plus petite espèce du genre.

Un mâle et une femelle.

8° *Hemithea flagellaria* : Envergure, 32 millimètres.

Couleur générale d'un roux lilas (peut-être vert clair lorsque l'insecte

est frais), avec fines lignes perpendiculaires blanches. Ligne coudée se détachant en blanc, à denticulations nervurales, et sinuee extérieurement. Ailes inférieures à denticulations arrondies formant une petite queue vers le milieu.

Antennes pectinées.

Deux mâles.

9° *Acidalia roseolimbata* : Envergure, 25 millimètres.

Ton général, ocre jaune très pâle, les quatre ailes bordées de rose tendre limité par la coudée sur laquelle apparaît par taches la couleur du fond; points cellulaires noirs.

Deux spécimens.

10° *Micromia Thibetaria* : Envergure, 29 millimètres.

Oblongue, d'un blanc soyeux, la coudée représentée par une double ligne droite tremblée de même que la subterminale; elles sont obliques aux ailes supérieures. Une ligne simple borde les quatre ailes avant la frange.

Antennes pectinées.

Deux mâles.

11° *Erosia auroguttata* : Corps et ailes blancs, les supérieures à trois lignes brunes droites; les deux médianes obliques, l'autre en bordure; ailes inférieures à deux pointes limitant une concavité bordée de brun; la dernière est suivie d'un fort point noir placé sur une demi-bande d'un jaune d'or; une ligne brisée inférieurement traverse ces ailes parallèlement au bord interne.

Une femelle.

12° *Erosia? Mabillaria* : Envergure, 26 millimètres.

Ailes oblongues, blanches, les inférieures prolongées en queue. Ligne coudée brune, fine, irrégulièrement tremblée et sinuee, très pâle sur les ailes inférieures; extra-basilaire indiquée par trois points.

Antennes à pectination courte et serrée.

Une mâle.

13° *Numeria lateritiaria* : Envergure, 34 millimètres.

A peu près de la forme d'*Eurymene dolabraria*; d'un jaune roux vif, brunissant aux bords externes, surtout aux ailes supérieures. La coudée est presque droite, oblique, de couleur gris-perle se continuant aux ailes inférieures ainsi que l'ombre médiane parallèle à celle-là. Une ombre formée de petits traits verticaux est à la place de l'extra-basilaire. Point cellulaire surmonté d'une ombre aux ailes supérieures.

Un mâle.

14° *Eusarca subfalcata* : Oblongue; ailes supérieures à apex aigu légèrement falqué, de couleur ocre jaune pâle avec la coudée figurée par une ligne brune, oblique, légèrement sinuée, suivie de deux bandes fondues d'un roux clair dont l'intervalle forme une ligne claire parallèle à la coudée. Ailes inférieures d'un blanc terne.

Une femelle.

15° *Selidosema catotæniata* : Envergure, 38 millimètres.

Couleur générale : ocre jaune clair légèrement tiqueté. Ailes supérieures à bord externe sinué extérieurement, inférieures irrégulièrement denticulées prolongées en petite queue. Ombre médiane indiquée aux supérieures par une tache costale violacée, et bien marquée aux inférieures par une bande violacée; ligne coudée figurée aux supérieures par des points nervuraux et se continuant plus accentuée aux inférieures où elle se réunit à l'ombre médiane vers le bord interne; la subterminale figurée aux ailes supérieures et inférieures par trois ou quatre taches dont la plus forte à l'angle interne. Franges entrecoupées de lunules violacées; antennes fortement pectinées.

Un mâle.

16° *Pachyodes Davidaria* : Envergure, 60 millimètres.

Ailes supérieures d'un vert clair strié perpendiculairement et largement maculé de brun clair, point cellulaire représenté par un trait oblique d'un noir velouté. Ailes inférieures d'un jaune d'or avec la base d'un brun clair et quatre grosses taches d'un brun azuré dont une centrale et trois à la place de la coudée. Franges brunâtres précédées de lunules internervurales noirâtres.

Une femelle.

17° *Pachyodes leucomelanaria* : Envergure, 52 millimètre.

Corps et ailes d'un blanc léger, ces dernières maculées perpendiculairement de noir tendre qui borde les supérieures jusqu'à la coudée; deux grosses taches aux inférieures : l'une à l'apex et l'autre vers l'angle anal qui est teinté de rouille. Collier roux très clair; antennes fortement pectinées jusqu'aux deux tiers.

Un mâle.

18° *Terpna dorsocristata* : Envergure, 58 millimètres.

D'un blanc terne finement aspergé d'atomes d'un brun verdâtre; coudée en angle obtus figurée par des points nervuraux bruns; une tache triangulaire costale d'un noir bleuâtre à la place de l'extra-basilaire; subterminale indiquée par trois taches d'un noir bleuâtre plus fortes aux ailes supérieures. Points cellulaires en angles obtus. Abdomen ayant une ligne dorsale de poils en touffes frisées.

Une femelle.

19° *Lobophora? nudariata* : Envergure, 26 millimètres.

Corps et ailes supérieures d'un blanc terne; la ligne coudée représentée par une série sinueuse de points noirs nervuraux et la subterminale par une série presque parallèle de points internervuraux plus gros; bord externe garni de points semblables contre la frange. Point cellulaire entouré extérieurement d'une ombre brunnâtre; extra-basilaire figurée par trois points précédés de trois autres basilaires et internervuraux. Ailes inférieures d'un gris très clair plus foncé au bord externe avec une ombre médiane et le point cellulaire à peine indiqué. Antennes filiformes.

Deux mâles.

20° *Cidaria Moupinata* : Envergure, 42 millimètres.

Ailes supérieures rousses, ardoisées à la base et au bord externe à partir de la coudée; celle-ci formée de quatre lignes sinueuses d'un brun vif à la côte et plus pâles inférieurement; subterminale en deux ou trois lignes parallèles à la coudée; apex marqué d'un triangle noirâtre. Basilaire et extra-basilaire droites formées de trois lignes tremblées d'un brun vif. Ailes inférieures gris pâle; la coudée est double et à peine indiquée.

Une femelle.

21° *Polythrena Miegata* : Envergure, 25 millimètres.

Jaune de chrome clair avec de larges taches noires; aux ailes supérieures, une apicale échancrée intérieurement suivie de deux rondes quelquefois réunies, une costale allongée sinuée, puis trois autres basilaires parallèles, quelquefois confondues; enfin une tache irrégulière au bord interne. Aux ailes inférieures la disposition des taches est à peu près la même. Abdomen annelé de noir.

Le dessous des ailes supérieures du mâle présente un faisceau de poils noirs, raides, partant de la partie inférieure de la base.

22° *Erateina discothyrate* : Envergure, 23 millimètres.

Couleur générale : brun foncé légèrement mordoré; une bande blanche transparente arrondie aux extrémités partage l'aile supérieure, trois points ronds également vitrés occupent les ailes : aux supérieures un apical et deux basilaires, aux inférieures ils sont placés vers la côte. Le dessous est plus pâle et présente de petites taches irrégulières fauves qui apparaissent en peu en dessus.

Un mâle.

---